



ARRASADOR 75.7 SG

INGREDIENTE ACTIVO

Nombre Común

Glifosato sal de amonio 757 g/kg (75.7%)

Nombre Químico

Glifosato

N-(phosphonomethyl)glycine

No. CAS

Glifosato CAS: 1071 – 83-6

FORMULACIÓN

Gránulos solubles

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Estado físico: Gránulos sólidos

Color: Blanco a amarillo claro

Olor: Inodoro

pH: 3.0 – 8.0

Estabilidad: Estable bajo condiciones normales de almacenamiento.

Inflamabilidad: No inflamable

Explosividad: No explosivo

MODO DE ACCIÓN

Arrasador 75,7 SG es un herbicida sistémico no selectivo absorbido por el follaje con rápida translocación en toda la planta. Inactivo en contacto con el suelo. No actúa sobre semillas que se encuentran debajo de la superficie del suelo y tampoco es absorbido por las raíces. No posee acción residual prolongada y no actúa como esterilizante del suelo.

RECOMENDACIONES DE USO

Arrasador 75.7 SG Se puede aplicar vía aérea o terrestre. La terrestre ya sea usando bombas de espalda o mochila, así como aplicaciones con tractor. Permite la utilización de volúmenes de agua bajos. Generalmente volúmenes entre 100 y 400 L/ha de agua son suficientes. Para las aplicaciones terrestres, con aspersores de espalda, se recomienda un volumen de agua de entre 50 y 200 litros por Ha, utilizando boquillas de baja descarga como las TJ 800050, TJ 8001, TK 0.5 y TK 1. Para las aplicaciones con tractor se recomiendan boquillas de mayor descarga, como las TJ 8002, TJ 8003, TK 1 y TK 2 o sus equivalentes, con el fin de evitar taponamientos.

MODO DE APLICACIÓN

Calcule la cantidad de agua a emplear acorde a la superficie que pretende proteger. Ponga en el tanque de mezcla la mitad de agua que se vaya a emplear, adicione la cantidad de **Arrasador 75.7 SG** de acuerdo a la dosis recomendada y agite. Adicione el resto de agua. Evite aplicar sobre malezas recién cortadas, pastoreadas o con polvo sobre el follaje.

USOS Y DOSIS

CULTIVO	MALEZAS	DOSIS	ÉPOCA DE APLICACIÓN	DE
Maíz <i>Zea mays</i>	Alambrillo <i>Digitaria sanguinalis</i> Arrocillo <i>Echinochloa colonum</i> Arroz rojo <i>Oriza sativa</i> Barba de indio <i>Fimbristylis annua</i> Bledo <i>Amaranthus</i> sp.	0.5 – 1.0 Kg/ha	Control general de malezas o mínima labranza. También en pre-transplante.	
Palma <i>Eleasis quinensis</i>	Canutillo, siempreprevia <i>Commelina diffusa</i> Churristate <i>Ipomoea</i> sp.		Control general dirigido en aplicaciones de parcheo.	
Café <i>Coffea</i> spp	Coyolillo <i>Cyperus</i> spp Cynodon <i>Cynodon dactylon</i> Escoba blanca <i>Sida rhombifolia</i> Gamalote <i>Paspalum fasciculatum</i>	0.5- 1.0 Kg/ 200 – 400 lt de agua		
Citricos <i>Citrus</i> spp	Golondrina erecta <i>Euphorbia hirta</i> Paja mona, Plumilla <i>Leptochloa filiformis</i> Pasto Kikuyo <i>Pennisetum clandestinum</i>			
Aguacate <i>Persea americana</i>	Pata de gallina <i>Eleusine indica</i> Pela-bolsillo <i>Rottboellia exaltata</i> Verdolaga <i>Portulaca oleracea</i> Zacate guinea <i>Panicum maximum</i>			
Banano <i>Musa</i> spp	Dicotiledoneas <i>Amaranthus</i> sp. <i>Portulaca oleracea</i>			
Frijol <i>Phaseolus</i> spp				
Macadamia <i>Macadamia</i>				
Sorgo <i>Sorghum vulgare</i>				
Melón <i>Cucumis melo</i>				
Piña <i>Ananas comosus</i>	Malezas poaceas <i>Rottboellia cochinchinensis</i> <i>Echinochloa</i> spp <i>Digitaria sanguinalis</i> <i>Paspalum fasciculatum</i> <i>Panicum maximum</i> <i>Eleusine indica</i>	1.5 – 2 kg/ha	Aplicación en post emergencia a la maleza cuando estas tengan de 2 a 3 hojas verdaderas o 30 días después. Utilizar 1500 L de agua/ha.	

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA

No tiene restricción por lo que puede ser aplicado en cualquier época del cultivo y cuántas veces sea necesario.

COMPATIBILIDAD:

No mezclar con otros herbicidas ya que su efecto puede reducir. Realice una prueba de compatibilidad antes de realizar cualquier mezcla.

AVISO DE GARANTÍA:

El fabricante garantiza la composición y calidad del producto. No se responsabiliza por el uso imprudente, excesivo o indebido por parte del consumidor.

CATEGORIA TOXICOLOGICA: 5

ATENCIÓN

PRESENTACIONES: 50 g, 500 g, 1 Kg, 5 kg, 10 kg y 25 kg.

FORMULADOR: Zhejiang Xinan Chemical Industrial Co., Ltd. – China

N° DE REGISTRO EN PANAMÁ: 6270

TITULAR DE REGISTRO: INTEROC CUSTER S.A.