

ABAMECTINA 1.8 EC

INSECTICIDAS

PROTECCIÓN DE CULTIVOS

COMPOSICIÓN

ABAMECTIN

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS

FAMILIA QUÍMICA	AVERMECTINA
CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA	GHS: 4
USOS	Insecticida
GRUPO IRAC:	Abamectin: 6

MODO DE ACCIÓN

ABAMECTINA 1.8 EC actúa por contacto e ingestión, presenta acción translaminar y sistémica localizada. Ataca el sistema nervioso, estimulando el sistema del ácido gamma.aminobutírico (GABA), inhibiendo la comunicación tanto nervio a nervio como de nervio a los músculos. El insecto afectado se paraliza, detiene su alimentación y muere a los pocos días.

RECOMENDACIONES DE USO PANAMÁ:

USOS

CULTIVO	PLAGA	DOSIS
Tomate <i>Solanum lycopersicum</i>	Mosca blanca <i>Bemisia tabaci</i>	0.3 – 1.2L/ha (0.21 – 0.84L/mz)
Chile <i>Capsicum annuum</i>	Minador de la hoja <i>Liriomiza spp.</i>	
Melón <i>Cucumis melo</i>	Arañita roja <i>Tetranychus spp.</i>	0.5 – 1.5L/ha (0.35 – 1.05L/mz)
Ornamentales		

PRESENTACIONES

1 L

Leer las especificaciones de este producto (hojas de seguridad y demás literatura relacionada) antes de su uso. Se recomiendan pruebas previas antes de utilizarlo. El formulador garantiza que el contenido de este producto está acorde a lo indicado. No es posible controlar el manejo y almacenamiento después de adquirido por lo que no se ofrece garantía por el uso incorrecto que realice el comprador o consumidor; quien deberá aceptar el riesgo bajo estas condiciones. Para mayor información contacte a su técnico de **DISAGRO®**.