

CLEFOX 22.5 EC

HERBICIDAS

PROTECCIÓN DE CULTIVOS

COMPOSICIÓN

HALOXYFOP-P-METHYL, CLETHODIM

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS

FAMILIA QUÍMICA	ARILOXIFENOXI PROPIONATO, CICLOHEXANODIONA
CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA	GHS: 5
USOS	Herbicida
CATEGORÍA	Haloxyfop-methyl: 1 Clethodim: 1

MODO DE ACCIÓN

CLEFOX® 22.5 EC es un herbicida sistémico y post-emergente para el control selectivo de malezas gramíneas en cultivos de hoja ancha. Es absorbido rápidamente por el follaje y traslocado hacia los puntos de crecimiento de las malezas. Sus ingredientes activos Haloxyfop-p-methyl y Clethodim actúan inhibiendo la enzima Acetil Coenzima-a carboxilasa (ACCase) en la síntesis de lípidos, dañando el tejido meristemático o punto de crecimiento. Como resultado, **CLEFOX® 22.5 EC** detiene el crecimiento de las gramíneas en crecimiento activo, mostrando clorosis, enrojecimiento de hojas y tallos y finalmente necrosis.

USOS PARA PANAMÁ:

USOS			
CULTIVO	MALEZA	DOSIS	OBSERVACIONES
Algodón <i>Gossypium hirsutum</i> Cebolla <i>Allium cepa</i> Remolacha <i>Beta vulgaris</i> Soya <i>Glycine max</i> Tabaco <i>Nicotiana tabacum</i> Tomate <i>Solanum lycopersicum</i> Papa <i>Solanum tuberosum</i>	Alambrillo <i>Digitaria sanguinalis</i> Arrocillo <i>Echinochloa colona</i> Caminadora <i>Rottboellia cochinchinensis</i> Gamalote <i>Paspalum fasciculatum</i> Jaragua <i>Hyparrhenia rufa</i> Pata de gallina <i>Eleusine indica</i> Liendre de puerco <i>Ischaemum rugosum</i>	Gramíneas anuales: 0.30 - 0.50 L/ha (0.21 - 0.35 L/mz) Gramíneas perennes: 0.40 - 0.60 L/ha (0.28 - 0.42 L/mz)	Aplicar en post-emergencia cuando las malezas tengan de 2 a 4 hojas.
Banano y plátano <i>Musa spp.</i> Café <i>Coffea arabica</i> Cítricos <i>Citrus spp.</i>	Zacate bermuda <i>Cynodon dactylon</i> Zacate cabezón <i>Paspalum virgatum</i>	0.50 - 0.70 L/ha (0.35 - 0.49 L/mz)	Aplicar en post-emergencia cuando las malezas tengan de 2 a 4 hojas.
Palma aceitera <i>Elaeis guineensis</i>	Zacate de agua <i>Echinochloa crus-galli</i> Zacate guinea <i>Panicum</i>	0.50 - 0.70 L/ha (0.35 - 0.49 L/mz)	Aplicar en las entrecalles, en plantaciones que no estén en producción. No se debe aplicar en la rodaja alrededor de las plantas de palma.

Maní <i>Arachis hypogaea</i>	maximum Zacate indio Rottboellia exaltata	0.40 - 0.60 L/ha (0.28 - 0.42 L/mz)	Aplicar en post emergencia cuando las malezas tengan de 2 a 4 hojas.
Melón <i>Cucumis melo</i> Pepino <i>Cucumis sativus</i> Sandía <i>Citrullus vulgaris</i> Zapallo, Calabaza, Calabacín Cucurbita maxima	Zacate Johnson Sorghum halepense Zacate kikuyo Pennisetum clandestinum	0.30 – 0.50L/ha (0.21 – 0.35L/mz)	Aplicar en post emergencia al cultivo y a la maleza.
Frutales		0.50 - 0.70 L/ha (0.35 - 0.49 L/mz)	Aplicar en post-emergencia cuando las malezas tengan de 2 a 4 hojas.
Áreas no agrícolas		0.50 - 1.00 L/ha (0.35 - 0.70 L/mz)	Aplicar cuando las malezas estén en crecimiento, 20 a 40 cm de altura.
Frijol Phaseolus vulgaris Arveja/Ejote francés Phaseolus vulgaris Soya Glycine max Maní Arachis hypogaea		0.40 - 0.60 L/ha (0.28 - 0.42 L/mz)	Arveja y ejote francés: aplicar en post emergencia entre los 15 y 30 días después de la siembra, dependiendo del grado de infestación de la maleza. Para soya y maní: aplicar en post emergencia cuando las malezas tengan de 2 a 4 hojas.
Frijol Phaseolus vulgaris	Zacate honduras Ixophorus unisetus Plumilla Leptochloa filiformis Zacate bermuda Cynodon dactylon Pasto estrella Cynodon niemuensis Cola de zorro Chloris virgata Pata de gallina Digitaria sanguinalis Arrocillo Echinochloa colona , Eleusine indica Pasto conejo Chloris radiata	0.30 – 0.70L/ha (0.21 – 0.53L/mz)	Aplicar en post emergencia entre los 15 y 30 días después de la siembra, dependiendo del grado de infestación de la maleza.

OTROS USOS	DOSIS
Madurante en caña de azúcar	0.4L/ha (0.28L/mz)

PRESENTACIONES
1 L, 250 ML

Leer las especificaciones de este producto (hojas de seguridad y demás literatura relacionada) antes de su uso. Se recomiendan pruebas previas antes de utilizarlo. El formulador garantiza que el contenido de este producto está acorde a lo indicado. No es posible controlar el manejo y almacenamiento después de adquirido por lo que no se ofrece garantía por el uso incorrecto que realice el comprador o consumidor; quien deberá aceptar el riesgo bajo estas condiciones. Para mayor información contacte a su técnico de **DISAGRO®**.