



¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y
CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS.

Confidor® 70 WG

INSECTICIDA-NEONICOTINOIDE
IMIDACLOPRID



DAÑINO
ANTÍDOTO: NO TIENE

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O
SE INHALA, PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA
PIEL POR EXPOSICIÓN

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN
MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS,
PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES,
ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y
MEDICAMENTOS.



USO AGRONÓMICO

MODO DE ACCIÓN: Confidor 70 WG, actúa en forma
sistémica, por ingestión y por contacto. En la planta el
producto tiene un efecto sistémico acropetal.

EQUIPO DE APLICACIÓN: Confidor 70 WG debe ser aplicado,
en drench, al cuello de la planta con aspersora de mochila sin
boquilla. Este producto también puede ser aplicado mediante
RIEGO POR GOTEÓ. Antes de hacer la aplicación verifique
que su aspersora se encuentre en buen estado de funcionamiento
y correctamente calibrada.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Vierta la mitad
de agua en la aspersora o tanque mezclador. Luego agregue
la dosis recomendada de Confidor 70 WG. Agregue agua hasta
completar la cantidad requerida. AGITE BIEN LA MEZCLA y
proceda a realizar la aplicación. Asegúrese de contar con el
equipo necesario para cargar la aspersora o tanque mezclador
y para dosificar el producto. Utilizar un volumen de agua de

200-400 l/ha (140 – 280 l/mz) de acuerdo al estado fenológico
del cultivo. Agitar bien y lavar el equipo al terminar la aplicación:
cubetas, embudo, paletas de agitación, cepillo, etc. Este equipo
debe estar bien marcado y no debe emplearse para otros usos.
Utilice el siguiente equipo de protección al manipular el producto,
durante la preparación de la mezcla, carga y aplicación: botas,
mascarilla, anteojos, guantes, dosificador y equipo de aplicación
en buen estado. (AL COMPRAR Confidor 70 WG EXIJA SU
MEDIDA CONFIDOR).



RECOMENDACIONES DE USO: Para los países de
Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras,
Panamá, Cuba y República Dominicana.

CULTIVOS	DOSIS	PLAGAS
Tomate <i>Solanum lycopersicum</i>	500 g/ha (350 g/mz)	Afidos, pulgones <i>Aphis</i> sp.
Chile <i>Capsicum</i> spp.	500 g/ha (350 g/mz)	Afidos, pulgones <i>Brevicoryne</i> sp. Afidos, pulgones <i>Myzus</i> sp.
Melón <i>Cucumis melo</i>	500 g/ha (350 g/mz)	Chicharrita <i>Trialeurodes</i> sp. Chicharrita <i>Empoasca</i> sp.
Tabaco <i>Nicotiana tabacum</i>	500 g/ha (350 g/mz)	Chicharrita <i>Sogatia</i> sp. Chinché <i>Disdercus</i> sp.
Frijol y Frijol ejotero <i>Phaseolus vulgaris</i>	500 g/ha (350 g/mz)	Chinché salibosa <i>Tomaspis postica</i> Escama <i>Lepidosaphes</i> sp.
Cítricos <i>Citrus</i> sp.	250 g/ha (175 g/mz)	Gallina ciega <i>Oligia</i> , Oruga <i>Phyllophaga</i> sp.
Maíz <i>Zea mays</i>	300 a 375 g/ha (210 a 260 g/mz)	Gusano alambre <i>Agriotes</i> sp.
Caña de Azúcar <i>Saccharum officinarum</i>	100 a 140 g/ha (75 a 100 g/mz)	Piojo blanco de la cabellera <i>Geococcus</i> sp.
Papa <i>Solanum tuberosum</i>	500 g/ha (350 g/mz)	Minador hoja cítricos <i>Phyllocnistis citrella</i>
Zucchini <i>Cucurbita</i> sp.	500 g/ha (350 g/mz)	Mosca blanca <i>Bemisia tabaci</i>
Café <i>Coffea arabica</i>	0.125 g/planta ó 400-600 g/ha (280-420 g/mz)	Mosca blanca cítricos <i>Dialeurodes citri</i>
Sandia <i>Citrullus lanatus</i>	500 g/ha (350 g/mz)	Mosca negra de la naranja <i>Aleurocanthus woglumi</i>
Pepino <i>Cucumis sativus</i>	500 g/ha (350 g/mz)	Picudo del banano <i>Cosmopolites sordidus</i>
Cebolla <i>Allium cepa</i>	500 g/ha (350 g/mz)	Trips <i>Thrips palmi</i>
Algodón <i>Gossypium hirsutum</i>	250 g/ha (175 g/mz)	
Arroz <i>Oryza sativa</i>	50 g/ha (35 g/mz)	

Brócoli <i>Brassica oleracea</i> var. <i>italica</i>	260 g/ha (208 g/mz)	
Banano y plátano <i>Musa</i> spp.	612 g/ha (0.36 g/planta en 200 ml de agua en drench)	
Arveja <i>Pisum sativum</i>	500 g/ha	

USO AUTORIZADO EN NICARAGUA:

CULTIVOS	PLAGAS	DOSIS
Algodón <i>Gossypium hirsutum</i>	<i>Bemisia tabaci</i> <i>Aphis</i> sp.	0,17-1,0 Kg / ha
Tomate <i>Solanum lycopersicum</i>	<i>Myzus</i> sp. <i>Trialeurodes</i> sp.	
Chile <i>Capsicum</i> spp.	<i>Thrips</i> sp.	
Frijol <i>Phaseolus vulgaris</i>	<i>Phyllophaga</i> sp.	

USOS AUTORIZADOS EN COSTA RICA:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS
Tomate <i>Solanum lycopersicum</i>	Mosca Blanca <i>Bemisia tabaci</i>	500 g/ha (350 g/mz)
Chile <i>Capsicum</i> spp.	Mosca Blanca <i>Bemisia tabaci</i>	500 g/ha (350 g/mz)
Melón <i>Cucumis melo</i>	Mosca Blanca <i>Bemisia tabaci</i>	250 g/ha (175 g/mz)
Sandia <i>Citrullus lanatus</i>	Mosca Blanca <i>Bemisia tabaci</i>	250 g/ha (175 g/mz)
Ornamentales	Mosca Blanca <i>Bemisia tabaci</i>	500 g/ha (350 g/mz)
Banano y Plátano <i>Musa</i> spp	Picudo Negro <i>Cosmopolites sordidus</i>	612 g/ha (en 1,700 plantas)
Chayote <i>Sechium edule</i>	Mosca Blanca <i>Bemisia tabaci</i>	250 g/ha (175 g/mz)
Algodón <i>Gossypium hirsutum</i>	Mosca Blanca <i>Bemisia tabaci</i>	250-300 g/ha

INTERVALO DE APLICACIÓN: Hortalizas: Realizar 1-2
aplicaciones al pie de la planta de 0-7 días y de 14-21 días
después del transplante, Banano: 1-2 al año en presencia de
Picudo.

**INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA
COSECHA:** Banano y plátano: 0 días. Resto de cultivos: 21 días.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: 24 horas.

FITOTOXICIDAD: Confidor 70 WG no es fitotóxico a las dosis
recomendadas.

COMPATIBILIDAD: Confidor 70 WG, es compatible con
Adherentes y Fertilizantes Foliares como: fungicidas e insecticidas
usuales, sin embargo, no deben dejarse mezclas de un día para
otro.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Conservar y transportar **Confidor 70 WG** en su empaque original, etiquetado y cerrado herméticamente. No transportarlo ni almacenarlo junto con alimentos, herbicidas, forrajes y medicamentos. Almacenarlo en un lugar fresco y seco. **Confidor 70 WG** no es inflamable, explosivo ni corrosivo. Manéjelo con cuidado para evitar derrames. Si ello ocurre recójalo con una pala y aplíquelo en el cultivo según las recomendaciones del producto.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO

BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



SINTOMAS DE INTOXICACIÓN: Apatía, debilidad muscular, malestar general, dolor de cabeza, vómitos y sudoración.

PRIMEROS AUXILIOS:

POR INGESTIÓN: No provocar el vómito, enjuagar la boca e ingerir de 3 a 4 cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. Acudir al médico.

POR INHALACIÓN: Alejar al paciente del área contaminada y colocarlo en un lugar fresco y ventilado.

POR CONTACTO CON LOS OJOS: Lave inmediatamente con agua limpia por 15 minutos.

POR CONTACTO CON LA PIEL: Quitar la ropa y zapatos contaminados y lavar el área afectada con abundante agua y jabón.

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

TRATAMIENTO MÉDICO: **Confidor 70 WG** no tiene antidoto, aplique tratamiento sintomático.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN

INSTITUCIÓN	PAÍS	TELÉFONOS
Centro de Información y Asesoría Toxicológica	GUATEMALA	(502) 2251-3560
Hospital Nacional Rosales	EL SALVADOR	(503) 2231-8262
Hospital Escuela	HONDURAS	(504) 232 2322 (504) 232 2316
Depto. de Toxicología / MINSA	NICARAGUA	(505) 2289-4700 ext. 17 (505) 8755-0983
Centro Nacional para el Control de las Intoxicaciones	COSTA RICA	(506) 22231028
Centro de Investigación e Información de Medicamentos y Tóxicos	PANAMA	(507) 5234948
Hospital Dr. Moscoso Puello	REP. DOMINICANA	(809) 681-7828
Karl Heusner Memorial Hospital	BELICE	(501) 223-0778
Hosp. Militar Carlos Finlay	CUBA	(537) 2601230 (537) 2608751
Villa Clara		(042) 22-6197 / 22-4770
Ciego de Ávila		(033) 49-1572 / 49-1575
Santiago de Cuba		(022) 64-1000 / 64-3864

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS



NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

APROVECHE EL CONTENIDO COMPLETO DEL ENVASE, CUANDO LO VACIE, LAVE Y ENJUAGUE TRES VECES CON AGUA LIMPIA Y AGREGUELA A LA MEZCLA YA PREPARADA.

Inutilice las bolsas vacías, perfóreas y elimínelas según la legislación y las normas locales vigentes.

EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS PONEN EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTÍA:

Garantizamos que la composición y concentración de este producto corresponden a lo indicado en la etiqueta. Sus instrucciones de uso se basan en rigurosos y extensos ensayos en todo el mundo. Sin embargo, como su aplicación y manejo están fuera de nuestro control, no damos ninguna garantía expresa o implícita sobre los resultados al usarlo si no se cumplen con las recomendaciones suministradas por el registrante. Al comprar este producto, el usuario adquiere la responsabilidad de su buen uso y manejo.

EL USO DE ESTE PRODUCTO, DE ACUERDO CON LOS PERÍODOS DE CARENENCIA Y LÍMITES DE TOLERANCIA CUMPLE CON LA LEGISLACIÓN DEL

PAÍS DE ORIGEN. EN LOS CULTIVOS DE EXPORTACIÓN ES DE PLENA RESPONSABILIDAD DEL USUARIO CONOCER LOS LÍMITES DE TOLERANCIA DE SU MERCADO DE DESTINO, SIENDO EL ÚNICO RESPONSABLE EN CUANTO A LA DECISIÓN DE EXPORTACIÓN.

FORMULADO POR:

Bayer CropScience AG
Alfred-Nobel Strasse 50 D-513268
Leverkusen, Alemania
Tel.: 0049 2173 382801
Fax: +49 2173 383285

IMPORTADO POR:

Bayer, S.A.
km 29.5 Ruta al Pacifico
Amatitlán, Guatemala
Tels. 6628-7200 / 6628-7211

James Brodie & Co. Ltd.
16 Regent Street
P.O. Box 365
Belize City, Belize
Tel. (501) 2277070

Bayer, S.A.
Complejo World Trade Center,
Torre 1, Nivel 5,
Calle el Mirador entre 87 y 89
Av. Norte, Colonia Escalón
San Salvador
(503) 2267-9000
Bodega: Km 7.5
Boulevard del Ejército Nacional,
Parque Industrial Regina, Nave 4,
Soyapango, San Salvador, El Salvador
(503) 2277-0701

Bayer, S.A.
km 11.5 Carretera a Masaya
Managua, Nicaragua
Tels.: 505-2796311

Bayer, S.A.
Oficentro Plaza Tempo, Edificio A (2do Piso)
Autopista Próspero Fernández,
contiguo al Hospital CIMA Escasú
Tel: 25056300, 41006300
Fax: 25056305, 41006305

Bayer, S.A. de C.V.
Boulevard Morazán, Colonia Castaño Sur
Avenida Ramon Ernesto Cruz
Calle Cedro Real Sur Este
Frente a Seguros Crefisa
Tegucigalpa, Honduras
Tels.: (504) 269-2100, 240-5100

Big Creek Group of Companies
Banana Enterprises Limited Agro Division
BELAGRO
Big Creek, Stann Creek District
Tel.: (501) 523-2166/2003

Bayer Panamá, S.A.
Complejo Global Business Terminal
Avenida Domingo Díaz
Torre A, 5to piso
El Dorado, Panamá
Tel. 2716100 Fax: 2716106

Prosser Fertilizer & Agrotec Co. Ltd.
Mile 8 Western Highway
P.O. Box 566
Belize City, Belize
Tel.: (501) 235410

Bayer, S.A.
Avenida Luperón
Zona Industrial de Herrera
Sto. Domingo, Rep. Dom.
Tel.: 1-809-5308086

Bayer, S.A.
Calle 17A, No. 17425 (Casa 69) e/ 174 y 190,
Cubanacán Playa,
Ciudad de La Habana, Cuba
Tel.: (537) 204-1363

PAÍS	NUMERO DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
GUATEMALA	33-408	16-07-12
HONDURAS	431-216-III	26-10-00
EL SALVADOR	33-408	05-09-96
COSTA RICA	4070	11-06-87
NICARAGUA	BY-191B-6-96	09-11-11
PANAMA	1291	29-01-10
BELICE	0247-3	28-11-11
R DOMINICANA	1656	06-09-11
CUBA	064/06	01-05-98