

ESPECIFICACIONES DE AGROINSUMOS				
TIPO DE AGROINSUMO: Fungicida Agrícola				
NOMBRE COMERCIAL: FLONEX® MZ 400				
FORMULACION: Suspensión acuosa	pH DE LA FORMULACIÓN: 6.5 a 8.0	COLOR: Amarillo	SOLUBILIDAD EN AGUA: Miscible	
COMPOSICION PORCENTUAL % EN PESO Ingrediente activo Mancozeb Producto de coordinación del ión Zinc y etilen bis ditiocarbamato de manganeso33.0 (Equivalente a 400 g de i.a./l) Ingredientes inertes Disolventes, dispersantes, humectantes y compuestos relacionados67.0 Total: 100.0		PRINCIPALES COMPUESTOS DE LA FORMULACIÓN: Zinc y etilen bis-ditiocarbamato de manganeso		
		FAMILIA QUÍMICA: Ditiocarbámico		
		FORMULA QUÍMICA: C ₄ H ₆ MnN ₂ S ₄ Zn _{1/10}		
MODO DE ACCIÓN: FLONEX® MZ 400 es un fungicida de contacto de amplio espectro para prevención y control de enfermedades fungosas que atacan el follaje de diversos cultivos. No se conoce resistencia de patógenos a este tipo de productos. Actúa por descomposición en presencia de humedad y oxígeno emitiendo principalmente el gas bisulfuro de carbono etilendisotiocianato los cuales son conocidos biocidas generales, de ahí su amplio espectro de acción. Como resultado de este desdoblamiento se forman hidróxidos de Mn y Zinc los cuales son fuente de nutrientes.				
CATEGORÍA DE PELIGRO: 5 Precaución		RESIDUALIDAD: Moderada	NÚMERO DE REGISTRO: RSCO-FUNG-0322-301-008-033	
USOS AUTORIZADOS:				
CULTIVOS	ENFERMEDADES	DOSIS L/ha	RECOMENDACIONES	
Apio (7)	Mancha foliar (<i>Cercospora apii</i>), Tizón tardío (<i>Septoria apii</i>)	3	Debe aplicarse a los primeros síntomas de la enfermedad repitiendo el tratamiento a intervalos de 5 a 7 días mientras prevalezcan condiciones de clima propicios para el desarrollo de los patógenos. Use las dosis mayores cuando la severidad de la infección sea alta o cuando el tamaño de la planta o frondosidad en el caso de frutales sea mayor.	
Calabacita, Melón, Pepino (5)	Tizón temprano (<i>Alternaria cucumerina</i>), Antracnosis (<i>Colletotrichum lagenarium</i>), Mildiu veloso (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	3 a 5		
Cebolla (7)	Moho gris (<i>Botrytis allii</i>), Mancha púrpura (<i>Alternaria porri</i>), Mildiu veloso (<i>Peronospora destructor</i>)	2.5 a 4.5		
Jitomate (Tomate) (5)	Tizón temprano (<i>Alternaria solani</i>), Tizón tardío (<i>Phytophthora infestans</i>), Moho (<i>Cladosporium fulvum</i>), Mancha de la hoja (<i>Septoria lycopersici</i> , <i>Stemphylium solani</i>), Antracnosis, (<i>Colletotrichum phomoides</i>)	3 a 5		
Maíz (40)	Mildiu (<i>Sclerospora spp</i>)	3 a 5		
Manzano (30)	Antracnosis (<i>Colletotrichum spp</i>), Fumagina (<i>Capnodium spp</i>), Roña o Sarna (<i>Venturia inaequalis</i>), Pudrición amarga (<i>Glomerella cingulata</i>)	250 a 400 ml en 100 L/ha		
Ornamentales (SL)	Mancha foliar (<i>Mycosphaerella rosicola</i>), Roya (<i>Phragmidium rosae</i>), Tizón temprano (<i>Alternaria sp</i>)	25 a 50 ml en 10 L de agua/ha		
Papa (7)	Tizón temprano (<i>Alternaria solani</i>), Tizón tardío (<i>Phytophthora infestans</i>), Mancha de la hoja (<i>Septoria lycopersici</i>)	3 a 5		
Papayo (14)	Antracnosis (<i>Colletotrichum gloeosporoides</i>), Fumagina (<i>Capnodium spp</i>)	300 a 400 ml en 100 L de agua/ha		
Plátano (Banano) (30)	Antracnosis (<i>Gloeosporium musarum</i>), Sigatoka negra (<i>Mycosphaerella difformis</i>), Sigatoka amarilla (<i>Mycosphaerella musicola</i>)	2.5 a 4		
Tabaco (10)	Antracnosis (<i>Colletotrichum spp</i>), Mancha foliar (<i>Alternaria spp</i>) Moho azul (<i>Peronospora tabacina</i>), Ojo de rana (<i>Cercospora nicotianae</i>)	3		
Vid (66)	Antracnosis (<i>Colletotrichum gloeosporoides</i>), Mildiu (<i>Plasmopara viticola</i>)	300 a 500 ml en 100 L de agua/ha		
Zanahoria (7)	Tizón foliar (<i>Alternaria dauci</i>)	3 a 4		
() Intervalo de seguridad en días entre la última aplicación y la cosecha. (SL) Intervalo de seguridad Sin Límite. Tiempo de reentrada: 24 horas después de aplicado el producto				
RECOMENDACIONES ESPECIFICAS: Lea detenidamente la etiqueta del producto y siga las indicaciones de uso.	PRESENTACIONES COMERCIALES: Envase de 1 L 18 L 60L	RESPONSABLE DEL PRODUCTO: Arysta LifeScience México, S.A. de C.V. Bldv. Jesús Valdés Sánchez No. 2369 Col. Europa, C.P. 25290. Saltillo, Coahuila de Zaragoza, México. Tel. 01 844 438 05 00.		