



Bayer CropScience

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y
CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS.

Nominee® 40 SC

HERBICIDA - BENZOICO
BISPYRIBAC - SODIUM

PRECAUCIÓN
ANTIDOTO: NO TIENE
DENSIDAD: 1,169 g / ml a 20° C

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O
SE INHALA, PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL
POR EXPOSICIÓN

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN
MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES,
ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



USO AGRONÓMICO MODO DE ACCIÓN:

Nominee 40 SC, es de efecto sistémico, inhibe de manera potente la actividad enzimática de la sintasa acetolactato (ALS) bloqueando la biosíntesis de varios aminoácidos de cadena ramificada, esenciales para el crecimiento de las plantas.

Nominee 40 SC, no golpea (no afecta) en absoluto el cultivo del arroz.

EQUIPO DE APLICACIÓN:

Aspersora de mochila, equipo accionado por tractor, equipo estacionario o avión equipado para aspersión. Para aplicar este producto, se recomienda utilizar boquillas de **abanico plano**.

Verifique que el equipo utilizado no tenga fugas, que esté en buen estado de funcionamiento y debidamente calibrado. Utilice para su aplicación, boquillas de **Abanico**.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Llene el tanque hasta la mitad con agua limpia. Agregue el adherente-humectante (Adherente 810 SL o Penetrante Bayer) en dosis de 1 ml. por litro de agua a usar (en aplicaciones aéreas utilice como mínimo 200 ml. por hectárea para asegurar un trabajo eficiente). Agite vigorosamente. Diluya la dosis recomendada de **Nominee 40 SC**, según el área a tratar, en 2 litros de agua y agite bien hasta lograr una premezcla total y uniforme. Vierta la premezcla en el tanque bajo constante agitación. Complete con agua el resto. Proceda a realizar la aplicación. Mantenga el agitador funcionando. Humedezca bien las hojas de las malezas.

Durante las actividades de manejo del producto, utilice siempre el equipo completo de protección: botas de hule, mascarilla, anteojos protectores, guantes, dosificador y aplicador.



RECOMENDACIONES DE USO:

Nominee 40 SC, está autorizado para utilizarse en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Belice.

Malezas que controla en el cultivo de Arroz *Oryza sativa*.

Nombre Común	Nombre Científico
Gramíneas	
Mangalarga-pangola-guarda rocío	<i>Digitaria sanguinalis</i>
Echinochloa-arrocillo	<i>Echinochloa colonum</i>
Echinochloa-arrocillo	<i>Echinochloa spp.</i>
Botón blanco-botoncillo	<i>Eclipta alba</i>
Eragrostis	<i>Eragrostis glomerata</i>
Falsa caminadora-manchado	<i>Ischaemum rugosum</i>
Zacate-chompipe-pasto hondureño	<i>Ixophorus uniselus</i>
Retumbo-caminadora	<i>Rottboellia spp.</i>

Nombre Común	Nombre Científico
Hojas Anchas	
Flor lila-frijolillo-palo de agua	<i>Aeschynomene spp.</i>
Mejorana Santa Lucía	<i>Ageratum conyzoides</i>
Pega-pegá	<i>Cleome viscosa</i>
Commelina-hierba de pollo	<i>Commelina difusa</i>
Lechoza-pescuela ó lechilla	<i>Euphorbia heterophylla</i>
Golondrina	<i>Euphorbia spp.</i>
Hiptis-orégano del monte	<i>Hiptis capitata</i>
Flor amarilla-clavito	<i>Ludwigia spp.</i>
Malva-malacra	<i>Malachra alceifolia</i>
Popa-miltomate	<i>Phisalis angulata</i>
Vaquita	<i>Sagittaria trifolia</i>
Frijolillo-choreque	<i>Vigna vexilata</i>
Buche de gallina-Cangrejillo	<i>Heteranthera limosa</i>
	<i>Murdania nudiflora</i>
Ciperáceas	
Coquitos o coyolillo	<i>Cyperus articulatus</i>
Coquitos o coyolillo	<i>Cyperus articulatus</i>
Coquitos o coyolillo	<i>Cyperus iria</i>
Coquitos o coyolillo	<i>Cyperus nigrus</i>
Coquitos o coyolillo	<i>Cyperus ferax</i>
Pelo de chino-barba de indio	<i>Fimbristis annua</i>
Pelo de chino-barba de indio	<i>Fimbristis spp.</i>
Navajuela	<i>Scleria pterota</i>

DOSIS Y EPOCA DE APLICACIÓN RECOMENDADAS:

-Arroz de riego o inundación: 100 ml/ha (70ml/mz) 18 a 21 días después de la siembra, o cuando las malezas tengan 2 a 3 hojas.

-Arroz de secano o temporal: 100-150 ml/ha (70 a 105 ml/mz) 12-15 días después de la siembra (ó con las malezas en estadio de 2 a 3 hojas) en mezcla con un herbicida preemergente. En aplicaciones tardías o escapes no exceder los 30-35 días después de la siembra.

NOTA: ES IMPRESCINDIBLE USAR ADHERENTE 810 SL O EL PENETRANTE BAYER. NO USE COADYUVANTES IONICOS O FERTILIZANTES CON IONES LIBRES, EN LA MEZCLA.

MANEJO DEL AGUA:

Drene el exceso de agua antes de aplicar el producto a las malezas. Aplique la lámina de agua nuevamente de 2 a 3 días después de la aplicación para obtener el control de malezas esperado.

INTERVALO ENTRE LA ULTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: 30 días.

INTERVALO DE REINGRESO AL AREA TRATADA:

Sin restricción, o al estar seco el cultivo tratado.

FITOTOXICIDAD:

Nominee 40 SC, no es fitotóxico al arroz si se usa de acuerdo a las recomendaciones.

COMPATIBILIDAD:

Nominee 40 SC, es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común en la agricultura. NO DEBE MEZCLARSE CON PROPANILES.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

Conservar y transportar el **Nominee 40 SC** en su empaque original etiquetado y cerrado herméticamente. No transportarlo ni almacenarlo junto con insecticidas, alimentos, forrajes y medicamentos. Almacenarlo en un lugar fresco y seco. **Nominee 40 SC** no es inflamable, ni explosivo ni corrosivo. Manéjese con cuidado para evitar derrames. Si ello ocurre, cúbralo con un material absorbente (ejemplo aserrín) y luego elimínalo en un lugar seguro según la legislación local vigente.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACION MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS



NO COMER, FUMAR O BEBER, DURANTE EL MANEJO Y APLICACION DE ESTE PRODUCTO
BAÑESE DESPUES DE TRABAJAR Y PONGASE ROPA LIMPIA



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

Puede causar sensibilización por contacto con la piel.

PRIMEROS AUXILIOS:

POR INGESTION: Provocar el vómito dando a beber jarabe de ipecacuana y /o estimulando la parte posterior de la garganta con la punta del dedo índice. Repita el estímulo hasta que el vómito fluya claro.

POR INHALACIÓN: Alejar al paciente del área contaminada hacia un lugar fresco y ventilado.

POR CONTACTO CON LOS OJOS: Lave

inmediatamente con agua limpia por 15 minutos.

POR CONTACTO CON LA PIEL: Quitar la ropa y zapatos contaminados y lavar el área afectada con abundante agua y jabón.

NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA

TRATAMIENTO MÉDICO:

Nominee 40 SC, no tiene antídoto específico. Aplique tratamiento sintomático.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN

PAIS	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN	TELEFONOS
GUATEMALA	Centro de Información y Asesoría Toxicológica	2320735
EL SALVADOR	Centro de Información Toxicológica	2280417
HONDURAS	Secretaría de Agricultura y Ganadería	232 6213
	Sanidad Vegetal	289 7150
NICARAGUA	Centro Nacional de Información Toxicológica	
COSTA RICA	Centro Nacional para el	2231028
	Control de las Intoxicaciones	
PANAMA	Centro de Investigación e Información de	269 2741
	Medicamentos y Tóxicos	
REP. DOMINICANA	Hospital Dr. Luis Aybar	684 3478
BELICE	Karl Heusner Memorial Hospital	501 2 30778

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE
MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:
APROVECHE EL CONTENIDO COMPLETO DEL ENVASE, CUANDO LO VACIE LAVE Y ENJUAGUE TRES VECES CON AGUA LIMPIA Y AGREGUELA A LA MEZCLA YA PREPARADA.
Inutilice los envases vacíos, perforelos y elimínelos según la legislación y las normas locales vigentes.

EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS PONEN EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTÍA:

Garantizamos que la composición y concentración de este producto corresponden a lo indicado en la etiqueta. Sus instrucciones de uso se basan en rigurosos y extensos ensayos en todo el mundo. Sin embargo, como su aplicación y manejo están

fuera de nuestro control, no damos ninguna garantía expresa o implícita sobre los resultados al usarlo. Al comprar este producto, el usuario adquiere la responsabilidad de su buen uso y manejo. **EL USO DE ESTE PRODUCTO, DE ACUERDO A LOS PERÍODOS DE CARENIA Y LÍMITES DE TOLERANCIA EN LOS CULTIVOS DE EXPORTACIÓN RECOMENDADOS EN ESTE PANFLETO Y CON APEGO A LAS NORMAS LEGALES DEL PAÍS PRODUCTOR Y DEL PAÍS IMPORTADOR, ES RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL USUARIO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE LAS PUBLICACIONES RESPECTIVAS O AL TÉCNICO EN LA MATERIA.**

FORMULADO POR:

KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.
4-26 Ikanohata I-chome, Taitoh-Ku, Tokio 110
Japón

IMPORTADO POR:

Bayer S. A. Blvd. Bayer Ciudad Merlot Apdo Postal 494 San Salvador, El Salvador 503-2782000	Bayer S. A. Av. Rep. de Chile y 1a. Calle Tegucigalpa, Honduras 504-393940	RAISA km 6.5 Carretera Norte, Bodega Bayer. Managua, Nicaragua Tel.: 505-244-2980
---	---	--

Bayer S. A. Calle Blancos Edif. Bayer Apdo. 5103-1000 San José, Costa Rica 506-2236166	Agencias NORCAL, S. A. Vía XI Juegos Centroamericanos Panamá, 9A. Panamá 507-2172111	Prosser Fertilizer & Agrotec Co. Ltd. Mile 8, Western Highway P.O.Box 566 Belice City Tel. 501-212038
--	--	--

PAIS	NÚMERO DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
GUATEMALA	33-430	03-08-98
EL SALVADOR	AG 98-7-503	20-07-98
HONDURAS	350.176-I	03-08-98
NICARAGUA	KC-299-7-97	18-11-97
COSTA RICA	4206	04-06-98
BELICE	0288-1	01-07-99