

# DUSTER 50 SC

## HERBICIDAS

PROTECCIÓN DE CULTIVOS

### COMPOSICIÓN

AMETRYN

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| FAMILIA QUÍMICA            | TRIAZINA  |
| CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA | GHS: 5    |
| USOS                       | Herbicida |
| CATEGORÍA                  | 5         |

### MODO DE ACCIÓN

**DUSTER® 50 SC** es un herbicida sistémico que controla numerosas malezas de hoja ancha y gramíneas que invaden los cultivos para los cuales se recomienda. Es absorbido por las hojas y raíces con translocación acropetálica vía xilema.

### USOS PARA PANAMÁ:

| USOS                                             |                                                              |                                   |                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CULTIVO                                          | MALEZA                                                       | DOSIS                             | OBSERVACIONES                                                                                                                                                          |
| Caña de azúcar<br><i>Saccharum officinarum</i>   | Zacate pinto <i>Echinochloa colonum</i>                      | 4.0 – 6.0L/ha<br>(2.8 – 4.2L/mz)  | Disolver las dosis recomendadas en un volumen de agua de 300L/ha (210L/mz)<br><br>Momento de aplicación: preemergencia o postemergencia temprana (2-3 hojas de maleza) |
| Piña <i>Ananas comosus</i>                       | Zacate de agua <i>Echinochloa crus-galli</i>                 | 2.5 – 5.0L/ha<br>(1.75 – 3.5L/mz) |                                                                                                                                                                        |
| Banano y plátano <i>Musa spp.</i>                | Pata de gallina <i>Eleusine indica</i>                       | 1.4L/ha<br>(0.98L/mz)             |                                                                                                                                                                        |
| Maíz <i>Zea mays</i><br>Sorgo <i>Sorghum spp</i> | Bledo <i>Amaranthus spp.</i><br>Lechosa <i>Euphorbia sp.</i> | 1.0L/ha<br>(0.7L/mz)              |                                                                                                                                                                        |

### PRESENTACIONES

20L

Leer las especificaciones de este producto (hojas de seguridad y demás literatura relacionada) antes de su uso. Se recomiendan pruebas previas antes de utilizarlo. El formulador garantiza que el contenido de este producto está acorde a lo indicado. No es posible controlar el manejo y almacenamiento después de adquirido por lo que no se ofrece garantía por el uso incorrecto que realice el comprador o consumidor; quien deberá aceptar el riesgo bajo estas condiciones. Para mayor información contacte a su técnico de **DISAGRO®**.