

MAGNUM 60 WP

HERBICIDAS

PROTECCIÓN DE CULTIVOS

COMPOSICIÓN

METSULFURON METHYL

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS

FAMILIA QUÍMICA	SULFONILUREA
CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA	GHS: 5
USOS	Herbicida
GRUPO HRAC	2

MODO DE ACCIÓN

MAGNUM® 60 WP es un herbicida para el control en postemergencia de malezas de hoja ancha en los cultivos recomendados. El producto es absorbido por el follaje y raíces, traslocándose a todos los órganos de las mismas. Los mejores resultados se obtienen sobre malezas en crecimiento activo y en los primeros estados de desarrollo.

USOS PARA PANAMÁ:

USOS			
CULTIVO	MALEZA	DOSIS	OBSERVACIONES
Arroz <i>Oryza sativa</i>	Pega-peg <i>Desmodium sp.</i> Verdolaga <i>Portulaca oleracea</i>	15g/ha (10.5g/mz)	Se recomienda utilizar un volumen de agua de 20 – 50L/ha (14 – 35L/mz) para aplicaciones aéreas y 200 – 400L/ha (140 – 280L/mz) para aplicaciones terrestres.
PASTOS	Flor amarilla <i>Melampodium divaricatum</i>	15 - 20 g/ha (10.5 – 14g/mz)	
Trigo <i>Triticum sativum</i> Cebada <i>Hordeum vulgare</i>	Buche de gallina o bora <i>Heteranthera spp</i> Campanilla <i>Ipomoea spp</i> Hierba de pollo <i>Commelina difusa</i> Balsilla <i>Corchorus orinocensis</i>	10 – 15g/ha (7 – 10.5g/mz)	
Caña de azúcar <i>Saccharum officinarum</i>	Balsilla <i>Eupatorium adorum</i> Lechosa <i>Euphorbia heterophylla</i> Dormidera <i>Mimosa spp</i>	15 - 20 g/ha (10.5 – 14g/mz)	
Café <i>Coffea arabica</i>	Piñita <i>Mudania nudiflora</i> Tripa de pollo <i>Euphorbia hirta</i> Palo de agua <i>Amaranthus coccineus</i> Helecho <i>Pteridium spp</i> Escobillo <i>Sida spp</i> Mortino <i>Clidemia spp</i> Rabo de ratón <i>Achyranthes indica</i> Pegador <i>Malva spp</i>	10 – 20g/ha (7 – 14g/mz)	

	Hierba de pollo <i>Commelina spp</i> Uchuva <i>Physelis sp.</i> Cenizo <i>Chenopodium paniculatum</i> Gualola <i>Poligonum segetum</i> Carretón, cadillo <i>Medicago hispida</i> Rábano <i>Raphanus sativus</i> Trébol <i>Trifolium repens</i> Sangre de toro <i>Rumex acetosella</i> Pajarito <i>Galinsoga ciliata</i> Nabo <i>Brassica campestris</i> Botoncillo <i>Eclipta alba</i> Meloncillo <i>Cucumis melo</i> Hierba-mora <i>Solanum nigrum</i> Añil <i>Indigofera sp</i> Frijolillo <i>Phaseolus lathyroides</i> Verbena morada <i>Stachytarpheta cayennensis</i> Bledo común <i>Amaranthus dublus</i>		
--	--	--	--

PRESENTACIONES

10g

Leer las especificaciones de este producto (hojas de seguridad y demás literatura relacionada) antes de su uso. Se recomiendan pruebas previas antes de utilizarlo. El formulador garantiza que el contenido de este producto está acorde a lo indicado. No es posible controlar el manejo y almacenamiento después de adquirido por lo que no se ofrece garantía por el uso incorrecto que realice el comprador o consumidor; quien deberá aceptar el riesgo bajo estas condiciones. Para mayor información contacte a su técnico de **DISAGRO®**.