

KORZY 15 SC

INSECTICIDAS PROTECCIÓN DE CULTIVOS

COMPOSICIÓN

CHLORANTRANILIPROLE, LAMBDA-CYHALOTHRIN

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS

FAMILIA QUÍMICA	DIAMIDA ANTRANÍLICA, PIRETROIDE
CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA	GHS: 5
USOS	Insecticida
GRUPO FRAC	Chlorantraniliprole: 28 Lambda-Cyhalothrin: 3A

MODO DE ACCIÓN

KORZY® 15 SC es un insecticida que combina doble modo de acción con actividad de contacto e ingestión. La mezcla de ambos principios activos determina una acción combinada sobre las hojas del cultivo, otorgando un amplio espectro de control. En el insecto activa los receptores de rianodina liberando calcio en los músculos de estos, afectando el proceso de contracción muscular. Adicional, inhibe el cierre del canal de sodio de la membrana celular produciendo una transmisión continua del impulso nervioso ocasionando pérdida de movilidad y capacidad de alimentarse.

USOS

CULTIVO	PLAGA	DOSIS
Arveja <i>Pisum sativum</i> Frijol / Ejote francés <i>Phaseolus vulgaris</i> Maní <i>Arachis hypogaea</i> Soja <i>Glycine max</i>	Áfidos, Pulgones <i>Aphis craccivora</i> , <i>Aphis gossypii</i> , <i>Macrosiphum solanifolii</i> , <i>Brevicoryne brassicae</i> , <i>Myzus persicae</i> , <i>Acyrthosiphon kondoi</i>	0.05 – 0.075L/ha (0.035 – 0.053L/mz)
Manzana <i>Malus domestica</i> Pera <i>Pyrus communis</i>	Gusano cogollero <i>Spodoptera frugiperda</i> Orugas, gusanos <i>Anticarsia gemmatilis</i> , <i>Rachiplusia un</i> , <i>Chrysodeixis includens</i> , <i>Estigmene acre</i> , <i>Heliothis spp.</i>	0.03 – 0.1L/ha (0.021 – 0.07L/mz)
Frambuesa <i>Rubus idaeus</i> Cereza <i>Prunus cerasus</i> Arándano <i>Cyanococcus</i>	Polilla <i>Cydia pomonella</i> Cochinilla <i>Pseudococcus spp.</i> , <i>Quadraspidotus perniciosus</i>	0.02 – 0.03L/ha (0.014 – 0.021L/mz)
Maíz <i>Zea mays</i> Trigo <i>Triticum spp.</i> Avena <i>Avena sativa</i> Arroz <i>Oryza sativa</i> Caña de azúcar <i>Saccharum officinarum</i>	Polilla <i>Cydia pomonella</i> Cochinilla <i>Pseudococcus spp.</i> , <i>Quadraspidotus perniciosus</i> Mosca de la fruta <i>Drosophila suzukii</i> , <i>Ceratitis capitata</i>	0.02 – 0.03L/ha (0.014 – 0.021L/mz)
Tomate <i>Solanum lycopersicum</i> Chile pimiento o dulce <i>Capsicum annum</i> Berenjena <i>Solanum melongena</i>	Gusano cogollero <i>Spodoptera frugiperda</i> Chinches <i>Oebalus spp.</i> Áfidos, pulgones <i>Aphis craccivora</i> , <i>Aphis gossypii</i> , <i>Macrosiphum solanifolii</i> , <i>Brevicoryne brassicae</i> , <i>Myzus persicae</i> , <i>Dalbulus maidis</i> , <i>Diabrotica spp.</i>	0.075 – 0.2L/ha (0.053 – 0.14L/mz)
Papa <i>Solanum tuberosum</i>	Mosca blanca <i>Bemisia tabaci</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i> Gusano cogollero <i>Spodoptera frugiperda</i> Polilla del tomate <i>Tuta absoluta</i> Gusano soldado <i>Spodoptera exigua</i>	0.3 – 0.5L/ha (0.21 – 0.35L/mz)
Ornamentales	Paratrioza <i>Paratrioza spp.</i> Gusano blanco <i>Premnotrypes vorax</i> Polilla guatemalteca <i>Tecla solanivora</i> Mosca blanca <i>Bemisia tabaci</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i>	0.3 – 0.4L/ha (0.21 – 0.28L/mz)
Repollo <i>Brassica oleracea var. capitata</i> Brócoli <i>Brassica oleracea var. itálica</i> Coliflor <i>Brassica oleracea var. botrytis</i>	Mosca blanca <i>Bemisia tabaci</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i> Áfidos, Pulgones <i>Aphis craccivora</i> , <i>Aphis gossypii</i> , <i>Macrosiphum solanifolii</i> , <i>Brevicoryne brassicae</i> , <i>Myzus persicae</i>	0.3 – 0.4L/ha (0.21 – 0.28L/mz)
	Polilla de las coles <i>Plutella xylostella</i> , <i>Trichoplusia ni</i> , <i>Pieris brassicae</i>	0.075 – 0.1L/ha (0.053 – 0.07L/mz)
		0.2L/ha (0.14L/mz)

PRESENTACIONES

100 ML, 1L

Leer las especificaciones de este producto (hojas de seguridad y demás literatura relacionada) antes de su uso. Se recomiendan pruebas previas antes de utilizarlo. El formulador garantiza que el contenido de este producto está acorde a lo indicado. No es posible controlar el manejo y almacenamiento después de adquirido por lo que no se ofrece garantía por el uso incorrecto que realice el comprador o consumidor; quien deberá aceptar el riesgo bajo estas condiciones. Para mayor información contacte a su técnico de **DISAGRO®**.