

# PRETILACHLOR 50 SC

## HERBICIDAS

PROTECCIÓN DE CULTIVOS

### COMPOSICIÓN

PRETILACHLOR 50%

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| FAMILIA QUÍMICA            | CLOROACETAMIDA |
| CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA | GHS: 5         |
| USOS                       | Herbicida      |
| CLASIFICACIÓN HRAC         | 15             |

### MODO DE ACCIÓN

**PRETILACHLOR 50 SC** es un herbicida selectivo, pre y post-emergente temprano utilizado en arroz simbra directa, sembrado en húmedo o arroz trasplantado. **PRETILACHLOR 50 SC** es absorbido por los brotes, y en menor grado por las raíces de las malezas que han germinado. Herbicida selectivo de acción preemergente para el control de malezas en arroz. **PRETILACHLOR 50 SC** es una cloro-acetanilida y actúa mediante la prevención de la formación de ácidos grasos de cadena muy larga (VLCFA) y reduce la división celular. Los tratamientos al suelo (aplicación preemergente) previenen la germinación de malezas. Las malezas morirán después de la emergencia.

### CULTIVOS PARA PANAMÁ:

#### USOS

| CULTIVO                   | MALEZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DOSIS                                                                                                                                  | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arroz <i>Oryza sativa</i> | Arrocillo <i>Echinochloa spp.</i><br>Gramilla <i>Digitaria spp.</i><br>Zacate amargo <i>Paspalum spp.</i><br>Pata de gallina <i>Eleusine indica</i><br>Fimbristilis <i>Fimbristylis miliacea</i><br>Cortadera <i>Cyperus ferax</i><br>Piñita <i>Murdannia nudiflora</i><br>Mozotillo <i>Bidens pilosa</i><br>Cabeza de pollo <i>Eclipta alba</i><br>Sulfatillo <i>Ludwigia sp.</i> | 1.5L/ha<br>(de trasplante)<br><br>2 – 2.5L/ha<br>(de secante/pre y post<br>emergencia)<br><br>2-3L/ha<br>(de riego/post<br>emergencia) | De trasplante: 2 – 4 días<br>después del trasplante.<br>De secano/pre emergencia:<br>aplicar después de la siembra.<br><br>De secano/post emergencia:<br>aplicar solamente si el suelo<br>esta húmedo. Aplicar en post<br>emergencia temprana, cuando<br>el arroz tenga 2 hojas<br>verdaderas.<br><br>De riego/post emergencia:<br>aplicar en post emergencia,<br>cuando el arroz tenga 2 hojas<br>verdaderas. |

### PRESENTACIONES

10L

Leer las especificaciones de este producto (hojas de seguridad y demás literatura relacionada) antes de su uso. Se recomiendan pruebas previas antes de utilizarlo. El formulador garantiza que el contenido de este producto está acorde a lo indicado. No es posible controlar el manejo y almacenamiento después de adquirido por lo que no se ofrece garantía por el uso incorrecto que realice el comprador o consumidor; quien deberá aceptar el riesgo bajo estas condiciones. Para mayor información contacte a su técnico de **DISAGRO®**.