

REGALIA MAXX 20 SC

FUNGICIDAS

PROTECCIÓN DE CULTIVOS

COMPOSICIÓN

Reynoutria sachalinensis

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS

FAMILIA QUÍMICA	BOTÁNICO
CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA	GHS: 5
USOS	Fungicida

MODO DE ACCIÓN

REGALIA® MAXX 20 SC es un inductor de resistencia sistémica el cual promueve el sistema de defensa de la planta mediante la producción de fitoalexinas, compuestos fenólicos y antioxidantes. Induce a la producción de ácido ferúlico el cual favorece la lignificación de paredes celulares que resisten la penetración de los patógenos. Además, inhibe la germinación de hongos e induce a la producción de glucanasa, compuesto que rompe las paredes celulares de los patógenos.

CULTIVOS PARA PANAMÁ:

USOS

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	OBSERVACIONES
Papa <i>Solanum tuberosum</i>	Tizón temprano <i>Alternaria solani</i>	1 – 2 L/ha (0.7 – 1.4 L/mz)	
Tomate <i>Solanum lycopersicum</i>	Tizón temprano <i>Alternaria solani</i> Oidio <i>Oidiosis haplophylli</i> , <i>Leveilula taurica</i>		
Chile <i>Capsicum anuum</i>	Tizón temprano <i>Alternaria solani</i> Oidio <i>Oidiosis haplophylli</i> , <i>Leveilula taurica</i>		
Tabaco <i>Nicotiana tabacum</i>	Moho azul <i>Peronospora tabacina</i>		
Cucurbitáceas: Melón <i>Cucumis melo</i> Sandía <i>Citrullus vulgaris</i> Pepino <i>Cucumis sativus</i> Zapallo <i>Cucurbita sp.</i>	Mildió polvoso <i>Erysiphe cichoracearum</i>		
Frijol <i>Phaseolus vulgaris</i>	Antracnosis <i>Colletotrichum indemthianum</i> Oidium <i>Erysiphe polygoni</i>		

Aguacate <i>Persea americana</i>	Antracnosis <i>Colletotrichum spp.</i>	1 – 5 L/ha (0.7 – 3.5 L/mz)	
Cítricos <i>Citrus spp.</i>	Antracnosis de flor <i>Colletotrichum acutatum</i>		
Papaya <i>Carica papaya</i>	Antracnosis <i>Colletotrichum spp.</i>		
Arroz <i>Oryza sativa</i>	Mal de talluelo <i>Pythium sp.</i> ; <i>Fusarium sp.</i> ; <i>Rhizoctonia solani</i> Hongos de semilla <i>Alternaria sp.</i> ; <i>Bipolaria oryzae.</i> ; <i>Curvularia oryzae</i> ; <i>Pyricularia oryzae</i> ; <i>Cladosporium oxysporum</i> ; <i>Fusarium sp.</i> ; <i>Rhizoctonia solani</i> ; <i>Gaeumannomyces graminis</i>	0.3 L/ha (0.21L/mz) (1ml/lb semilla) Tratamiento de semilla	Mantener la dosis por hectárea cuando la cantidad de semilla sea menor a 3qq/ha. La impregnación manual puede realizarse directamente en campo con 1 litro de solución por quintal de semilla o hasta 5L/qq. La impregnación puede hacerse directamente en campo, con maquinas para el tratamiento de semilla o bien, con mezcladoras de concreto. La impregnación puede hacerse en plantas de tratamiento industrial.
	Mancha naranja <i>Gaeumannomyces graminis</i> Añublo de la vaina <i>Rhizoctonia solani</i>	0.6 – 0.8L/ha (0.42 – 0.56Lmz) Aplicación vía foliar	Mezclar con los fungicidas que normalmente se aplican por el control de enfermedades entre los 30 a 45 días después de la siembra.
	Complejo de manchado de la espiga <i>Helminthosporium oryzae</i> , <i>Cercospora oryzae</i> , <i>Sarocladya oryzae</i> , <i>Bipolaris oryzae</i> , <i>Alternaria spp.</i> , <i>Fusarium spp.</i> , <i>Curvularia spp.</i>	0.6 – 0.8L/ha (0.42 – 0.56Lmz) Aplicación vía foliar	Mezclar con los fungicidas que normalmente se aplican para el control de enfermedades entre los 60 a 70 días después de la siembra.

PRESENTACIONES

250 ML, 500 ML, 1 L

Leer las especificaciones de este producto (hojas de seguridad y demás literatura relacionada) antes de su uso. Se recomiendan pruebas previas antes de utilizarlo. El formulador garantiza que el contenido de este producto está acorde a lo indicado. No es posible controlar el manejo y almacenamiento después de adquirido por lo que no se ofrece garantía por el uso incorrecto que realice el comprador o consumidor; quien deberá aceptar el riesgo bajo estas condiciones. Para mayor información contacte a su técnico de **DISAGRO®**.