

SUPRALID 12 SL

INSECTICIDAS

PROTECCIÓN DE CULTIVOS

COMPOSICIÓN

ARGEMONINA, BERBERINA, RICININA, α -TERTHIENIL

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS

FAMILIA QUÍMICA	ALCALOIDE, ALQUILSULFATO
CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA	GHS: 5
USOS	Insecticida

MODO DE ACCIÓN

SUPRALID® 12 SL es un insecticida bioquímico que ejerce su acción por contacto e ingestión a través de un grupo de componentes orgánicos con diferentes modos de acción, siendo difícil que los insectos logren eliminarlo de su cuerpo o escapen. **SUPRALID® 12 SL** traspasa fácilmente la cutícula de los insectos afectando el sistema nervioso central y periférico, ocasionando convulsiones, tetanización de músculos y muerte del insecto.

CULTIVOS PARA PANAMÁ:

USOS			
CULTIVO	PLAGA	DOSIS	OBSERVACIONES
Aguacate <i>Persea americana</i>	Araña roja <i>Oligonychus punicae</i>	3.0 L/ha (2.1 L/mz)	Volumen de aplicación 1500 – 2000L/ha.
Ajo <i>Allium sativum</i> Cebolla <i>Allium cepa</i> Cebollín <i>Allium fistulosum</i> Espárrago <i>Asparagus officinalis</i> Arveja china y dulce <i>Pisum sativum</i> Ejote francés <i>Phaseolus vulgaris</i>	Trips <i>Thrips tabaci</i>	1.5 – 2.0 L/ha (0.7 – 1.4 L/mz)	Volumen de agua 450L de agua/ha.
Fresa <i>Fragaria vesca</i> Frambuesa <i>Rubus idaeus</i> Mora <i>Rubus ulmifolius</i>	Araña roja <i>Tetranychus urticae</i> Trips <i>Frankliniella occidentalis</i>	2.0 - 3.0 L/ha (1.4 - 2.1 L/mz)	Volumen de aplicación 600 L de agua/ha.
Brócoli <i>Brassica oleracea var. itálica</i> Repollo <i>B. oleracea var. capitata</i> Col de Bruselas <i>B. oleracea var. gemmifera</i> Coliflor <i>B. oleracea var. botrytis</i>	Palomilla dorso de diamante <i>Plutella xylostella</i> Gusano falso medidor <i>Trichoplusia ni</i>	3.0L/ha (2.1L/mz)	Volumen de aplicación de 450 a 500L/ de agua /ha.
Chile pimiento <i>Capsicum annuum</i> Chile habanero <i>Capsicum chinense</i> Chile jalapeño <i>Capsicum annuum var. glabriusculum</i> Berenjena <i>Solanum melongena</i>	Mosquita blanca <i>Bemisia tabaci</i>	1.5 – 2.0 L/ha (0.7 – 1.4 L/mz)	Aplicación al follaje
Tomate <i>Solanum lycopersicum</i> Papa <i>Solanum tuberosum</i> Tabaco <i>Nicotiana tabacum</i>			
Calabacita <i>C. pepo var. grey succinini</i> Calabaza <i>Cucurbita pepo</i> Melón <i>Cucumis melo</i> Sandía <i>Citrullus lanatus</i> Pepino <i>Cucumis sativus</i>	Trips <i>Frankliniella occidentalis</i> Araña roja <i>Tetranychus urticae</i>		

Papaya <i>Carica papaya</i>	Araña roja <i>Tetranychus urticae</i> Áfidos <i>Myzus persicae</i> Mosca blanca <i>Bemisia tabaci</i>		
------------------------------------	--	--	--

PRESENTACIONES

1 L, 200 L

Leer las especificaciones de este producto (hojas de seguridad y demás literatura relacionada) antes de su uso. Se recomiendan pruebas previas antes de utilizarlo. El formulador garantiza que el contenido de este producto está acorde a lo indicado. No es posible controlar el manejo y almacenamiento después de adquirido por lo que no se ofrece garantía por el uso incorrecto que realice el comprador o consumidor; quien deberá aceptar el riesgo bajo estas condiciones. Para mayor información contacte a su técnico de **DISAGRO®**.